

藥品使用指導單

可使保朗®膠囊 (Cospanon® 40 mg)

■ 藥品成分名

Flopropione

■ 藥品外觀

深紅色/淡黃色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[CS40][CS40]

■ 作用

用以解除膽道及胰臟炎等所引發的痙攣與疼痛。

■ 用法

- 建議飯後服用。
- 若為高齡患者，通常會從較低劑量開始使用，請注意使用後是否有任何不適。

■ 注意事項

- 患有肝、腎、心臟疾病患者，應主動告知醫生及藥師。
- 不建議用於孕婦、哺乳婦女及幼童。
- 禁止使用於曾對於本成分過敏之患者。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 噁心、嘔吐、心灼熱、腹脹感，當上述的症狀若持續且加重，請先停藥並回診告知醫師進行調整。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.06
- PFS-7200-0051

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮