

藥品使用指導單

永康緒®膜衣錠 (Mocalm®0.5/10mg)

■ 藥品成分名

Flupentixol 0.5 mg/Melitracen 10 mg

■ 藥品外觀

粉紅色圓凸形，錠劑；標記：[S]

■ 作用

治療情緒低落、緩和焦慮相關症狀。

■ 用法

- 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 曾對Mocalm成份過敏、最近發生心肌梗塞、酒精中毒者、孕婦、授乳婦女、18歲以下之兒童與青少年禁止使用。
- 若有心臟疾病、青光眼、癲癇、甲狀腺機能異常、前列腺肥大、尿滯留患者，應主動告知醫師及藥師。
- 服用任何藥物前應告知醫師及藥師。本藥品與部分抗憂鬱藥物同時併用可能會造成交互作用，導致症狀如：精神混亂、昏迷、興奮、發抖、肌肉痙攣、肌肉僵硬、發燒、心跳加快、噁心、嘔吐、瞳孔放大、腹瀉等。
- 服用此藥品應避免喝酒。
- 此藥物會產生嗜睡、倦怠，服藥期間應避免從事需精神集中之工作，並且慎防跌倒。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 鎮靜、嗜睡、發汗、口乾、便秘、體重改變、勃起功能障礙，若發生後無法忍受或症狀加劇，請回診告知醫師進行調整。
- 若出現體溫異常過高 (40°C以上)、肌肉僵硬，大量流口水和出汗、呼吸困難，呼吸急促，請立即停藥並盡速就醫。

■ 保存方法

- 於室溫25°C以下乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.03
- PFS-7200-0053

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮