藥品使用指導單
帝拔癲®腸溶錠 (Depakine ® 200 mg)

■ 藥品成分名

Valproate sodium

■ 藥品外觀

白色，圓凸形，錠劑；大小：1.04 公分

■ 作用

帝拔癲®腸溶錠為口服的抗癲癇製劑，主要治療泛發 性與局部性癲癇症、兒童抽搐或兒童熱性抽搐。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

■ 注意事項

- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，甚至突然停藥以避免不必要之副作用。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 長期使用，應定期檢查肝功能和血液血球數量。
- 盡量避免或減少攝取含酒精性飲料。
- 本藥品易與其他藥品產生交互作用，影響藥效或增加副作用發生的風險，若您需使用其他藥品，請與您的醫師及藥師聯繫並確認。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：噁心、嘔吐、腸胃不適、暫時性掉髮、體重增加。
- 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重嘔吐、不正常出血、黃疸、皮膚紅腫、癲癇控制不好。
- 服用帝拔癲® 腸溶錠可能導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操縱機械。注意力不易集中容易跌倒請小心。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 可能增加跌倒的風險

- 服用此藥物可能會產生頭暈、嗜睡、視覺障礙等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
■ 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 113.06
■ PFS-7200-0055