

藥品使用指導單

當立平®錠 (Diapin® 2 mg)

■ 藥品成分名

Diazepam

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：0.7 公分；標記：[PLt][D]

■ 作用

當立平®錠是用於改善焦慮、安眠、癲癇或肌肉痙攣，緩解急性酒癮發作時的不適感。

■ 用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

■ 注意事項

- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 若對任何一種Benzodiazepines類藥物過敏，對本藥亦可能產生過敏，請將過敏史告知醫師，以利醫師評估。
- 請避免與含酒精性飲料或葡萄柚汁併服。
- 使用此藥品後請勿開車或操作精密的儀器機械，並小心走路預防可能發生的跌倒。
- 若有服用其他藥物（包括保健食品）請先告知醫生或藥師。
- 若有計劃懷孕（或是已經懷孕）及哺乳婦女者，請先告知醫生。
- 使用中而突然停藥，可能產生戒斷現象，停止服用此藥品前，需請醫生先做評估後才可停用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩、暫時性的失憶、低血壓等；通常只會出現在治療初期，繼續服用後通常症狀都會漸漸消失。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：憂鬱、睡眠障礙、激動、心跳加快、眼睛變黃、講話困難、無法控制肌肉等，請立即就醫。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 113.06
- PFS-7200-0056

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮