

藥品使用指導單

制暈效糖衣錠 (Dinidol® 25 mg)

■ 藥品成分名

Diphenidol

■ 藥品外觀

淡紅色，圓形，錠劑；大小：0.8公分；標記：[STD，158]

■ 作用

止吐，暈眩治療用藥

■ 用法

- 成人劑量為每次1-2顆，一天三次或每4小時一次
- 孩童體重低於22.7kg者不適用本藥品，體重高於22.7kg者建議劑量為25mg,每4小時使用一次。
- 請遵照醫(藥)師指示服藥。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 注意事項

- 對本藥品過敏之病人不宜使用。
- 本藥品不宜使用於腎機能重度障礙者。
- 使用本藥品後若出現口乾、胸部灼熱感、散瞳、心悸等症狀宜減藥量或停藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 本藥品常見的副作用包含口乾、嗜睡、胸部灼熱感、散瞳、心悸等症狀，一般經減少藥量或是停藥後症狀即消失。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部 / 113.06

PFS-7200-0057

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮