

藥品使用指導單

壓悅達®持續性藥效錠 (Adapine® 30mg)

■ 藥品成分名

Nifedipine

■ 藥品外觀

紅褐色雙凸圓形膜衣錠，標記【Adapine 30】

■ 作用

治療狹心症、高血壓（包含妊娠高血壓）

■ 用法

- 依疾病的嚴重程度及病患反應，由醫師決定治療期間長短及每日所需劑量。若無醫師指示，請勿隨意調整服用之劑量與次數。
- 應整錠和少量水一起吞服，不可咬嚼或弄碎服用。
- 食物不影響本藥品吸收，飯前或飯後均可。
- 禁止與葡萄柚汁併服，與葡萄柚汁併用會導致本藥品在體內含量升高及作用延長，降血壓效果可能過強。

■ 注意事項

- 禁止使用於以下族群
 - 對於nifedipine或其所含任何賦形劑過敏的病患
- 孕婦、老年人、肝功能不全、曾有心肌梗塞或發生心肌缺血的患者，使用此藥物前應經由醫師審慎評估。
- 使用本藥品治療期間，建議停止哺乳。
- 本藥品之外殼並不會在體內被分解，所以可能會在糞便中看到完整外殼，也可能會因此引起腸胃道阻塞症狀。若您有腸胃道阻塞、發炎或腸胃道蠕動較差等相關問題，請先與醫師確認是否適用。
- 本藥品容易與多種抗生素、抗病毒、精神科藥物等發生交互作用，若同時正在治療結核病、HIV感染、黴菌感染或癲癇等，請務必告知醫師或醫療人員，進行藥物評估，以確保藥物治療的最佳效果，避免副作用的發生。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：水腫、頭痛、便秘
- 如果服藥後出現任何讓您困擾的症狀，請停用並告知您的醫療人員。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於25°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/113.06

■ PFS-7200-0061

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮