

藥品使用指導單

癌必莎爾®膜衣錠 (Ternibin® 250 mg)

■ 藥品成分名

Gefitinib

■ 藥品外觀

棕色圓形錠劑，標記：[265][CCP]

■ 作用

癌必莎爾®膜衣錠可干擾您體內癌細胞的生長，用來治療癌症，如：非小細胞肺癌。

■ 用法

- 按照醫生的指示時間服用。
- 通常每天一次，可空腹或與食物併用。
- 無法整粒吞服錠劑或需以鼻胃管餵食時，可將錠劑於水中溶散後服用。
作法：將錠劑放入半杯飲用水(非碳酸類)中，不需壓碎，攪拌直到錠劑崩散(約 15 分鐘)後，立即喝下此溶液，再以半杯水沖洗杯緣並喝下。

■ 注意事項

- 若您對於Gefitinib或任何其他藥物過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 若您目前有服用其他藥物，請告知您的醫(藥)師。
- 若您曾有肝臟疾病，請告知您的醫師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 若您有要施打任何疫苗(如：麻疹或流行感冒疫苗)，請先告知您的醫師。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 服用此藥者，駕駛及機器操作時應小心注意。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：腹瀉、皮疹、皮癢、皮膚乾燥及面皰。這些症狀通常發生於治療的第一個月，且通常隨時間會慢慢恢復，若症狀持續嚴重，請告知您的醫師。
- 若有下述症狀，請立刻通知您的醫生：任何眼部症狀(如：眼部發炎、流淚、光敏感、視覺模糊、眼睛痛和/或紅眼)、嚴重或持續之腹瀉、噁心嘔吐、食慾不振、呼吸困難、咳嗽及發燒等。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 113.07
- PFS-7200-0069

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮