

藥品使用指導單

舒利諾[®]錠 (Furide[®] 40 mg)

■ 藥品成分名

Furosemide

■ 藥品外觀

白色圓形錠劑，刻痕：[STD 282]

■ 作用

用於利尿、治療高血壓、充血性心衰竭、消除水腫。

■ 用法

- 請確實遵照醫師的指示服用藥物。
- 若為每日服用一次，則建議在早上服用，勿在就寢前使用，以避免因頻尿而影響睡眠。

■ 注意事項

- 對Furosemide或本藥品賦形劑過敏者，請勿使用此藥。
- 對磺胺類藥物過敏者請小心使用。
- 服藥前，若您計畫懷孕、已懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病、無尿症、糖尿病、痛風病史，應告知您的醫師及藥師。
- 本藥品與其他藥品併服可能產生藥物交互作用。服藥期間，如果要服用其他藥品（包含處方藥、非處方藥、保健食品、中草藥等），應先諮詢醫師或藥師。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料，會加重姿勢性低血壓。
- 若需長期治療，需定期監測血中電解質、尿素、肌酸酐值。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請告知醫師：心跳加快、口乾或口渴加重、肌肉痙攣或疼痛、腸胃不適、噁心嘔吐、腹瀉、便秘、視力模糊、頭痛、異常疲累及虛弱、關節痛。
- 如果出現劇烈胃痛伴有噁心嘔吐、耳鳴或失聰、皮膚過敏(紅疹、脫皮)、眼睛或皮膚發黃等情形，請盡速就醫。
- 服用本藥品可能會增加病患如廁的頻率，須小心預防跌倒的發生。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.07
- PFS-7200-0090

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

