

藥品使用指導單

除癲達[®]膜衣錠 (Trileptal[®] 300 mg)

■ 藥品成分名

Oxcarbazepine

■ 藥品外觀

鮮橙黃色，長圓柱形，錠劑，大小：1.5 公分，標記：[CG，CG][TE，TE]

■ 作用

- 成人局部癲癇發作之單一或輔助治療
- 大於一個月孩童局部癲癇發作之輔助治療
- 神經痛治療

■ 用法

- 盡量保持在每日固定時間按照醫生的指示服用，切勿自行調整或停藥。
- 通常為一天兩次，可飯前或飯後服用。

■ 注意事項

- 若您計畫懷孕或已懷孕、哺乳，或有腎臟、心臟、肝臟疾病，或曾對此藥成份過敏者，應告知您的醫生及藥師。
- 此藥會降低口服避孕藥的效果，服藥期間建議採用其他避孕措施。
- 若有服用其他抗癲癇藥品，易有藥物交互作用問題，須先告知您的醫師或藥師。
- 服用此藥後，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式減量，避免癲癇發作次數增加。
- HLA-B*1502 基因陽性者應避免使用此藥。服藥期間若發生臉部或脖子腫脹、斑疹、水泡，伴隨疲勞、發燒、噁心、食慾減少等症狀時，請立刻停藥並告知醫師。
- 酒精會增加此藥的鎮靜作用，服藥期間應避免飲酒。
- 服用本藥可能會造成頭暈、嗜睡、視力模糊，若有駕駛車輛時應謹慎小心，避免操作機器或從事危險工作。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下輕微至中度副作用，大多為短暫性的，請您不用驚慌：頭暈、嗜睡、疲倦、噁心嘔吐、視覺障礙。
當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若發生較嚴重的副作用，請立即就醫：運動失調、眼球震顫、意識混亂、嚴重皮膚過敏反應。

■ 保存方法

- 儲存於30°C以下乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.08修
- PFS-7200-0106

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮