

藥品使用指導單

泰嘉®錠 (Tykerb® 250 mg)

■ 藥品成分名

Lapatinib Ditosylate

■ 藥品外觀

橘色，橢圓形，錠劑；標記：[GSXJG]

■ 作用

為抗腫瘤標靶治療藥物，用來治療進展性或轉移性乳癌。

■ 用法

此藥品需空腹服用（飯前 1 小時或飯後至少 1 小時），請依照醫師指示的時間服用。

■ 注意事項

- 若您已知對此類藥物過敏或有肝、腎、肺臟疾病，請先告訴您的醫師或藥師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢。
- 建議在治療期間與服用最後一劑後至少 7 天內不要哺乳。
- 盡量避免或減少酒精性飲料及葡萄柚汁的攝取，以免影響藥品的代謝及療效。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 若您要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、手腳發紅、手腳腫痛、噁心嘔吐、食慾不振、腹瀉、發燒、咳嗽、甲溝炎、疲倦、皮膚乾燥、失眠、頭痛、四肢疼痛。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較嚴重不良反應，應立即就醫：嚴重腹瀉、心臟或肺部不適。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 113.10.05
- PFS-7200-0108

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮