

藥品使用指導單

糖漸平[®]膜衣錠 (Trajenta[®] 5 mg)

■ 藥品成分名

Linagliptin

■ 藥品外觀

- 淺紅色、圓形、兩面中央凸起、邊緣呈斜面；標記：兩面分別壓印「D5」字樣及百靈佳殷格翰公司標誌。

■ 作用

為口服的抗糖尿病製劑，主要用於輔助治療第二型糖尿病，以控制您的血糖。

■ 用法

- 建議劑量為每日一錠，劑量因人而異，請按醫囑服藥。
- 可與食物一起服用，亦可空腹服用。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有其他疾病、正準備手術等，應告知您的醫生及藥師。
- 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制糖尿病。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 若有下列少見的情形，請立即就醫：持續性嚴重腹痛、過敏反應症狀（例如皮疹、皮膚剝落或脫皮、蕁麻疹、皮膚腫脹；或臉部、嘴唇、舌頭和喉嚨腫脹，可能造成呼吸或吞嚥困難）、嚴重關節疼痛、出現水泡或糜爛的情形。
- 可能造成低血糖症狀請小心（請見低血糖症狀處理方法）。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 發生低血糖該怎麼辦？

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
 1. 血糖值小於 70 mg/dL：立即服用 120-180 毫升果汁或糖果 8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
 2. 血糖值小於 50 mg/dL：立即服用 180-250 毫升果汁或糖果 10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
 3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
 4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

■ 發生高血糖該怎麼辦？

- 症狀：例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。
- 處理方式：請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 114.01
- PFS-7200-0143

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮