

藥品使用指導單

福適佳[®]錠 (Forxiga[®] 10 mg)

■ 藥品成分名

Dapagliflozin

■ 藥品外觀

黃色，菱形，錠劑；大小：1.1 公分；標記：[10][1428]

■ 作用

- 治療第二型糖尿病：配合飲食和運動，以改善血糖控制、預防心血管事件、降低慢性腎臟病新發生或惡化的風險。
- 可降低心衰竭病人心血管死亡、心衰竭住院和心衰竭緊急就醫的風險。
- 用於有惡化風險之慢性腎臟病的成人，可降低持續性腎絲球過濾率下降、末期腎病、心衰竭住院和心血管死亡的風險。

■ 用法

請按照醫師指示，於早晨服用，隨餐或空腹皆可，以足量開水吞服使用。

■ 注意事項

- 若您有計畫或已懷孕、哺乳、急性感染疾病、血尿，請立即回診，告知您的醫生。並請定期監測血糖值。
- 福適佳[®]錠可能增加您泌尿道或生殖器感染的機會，若有疑似感染症狀，請務必提早就醫確認及治療。
- 請依照醫師指示服用藥品，並攝取充足水分，避免副作用的發生。
- 若需使用其他藥物，因可能造成藥物吸收上的干擾，請務必告知醫師或藥師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿慌張：排尿增加、噁心、血壓降低。
- 若症狀持續無改善，或發生下列症狀，請立即與您的醫師聯絡：高燒、失去意識、呼吸困難、排尿疼痛、無法解尿、血尿、生殖器部位疼痛。
- 服用**福適佳®錠**可能造成低血糖症狀請小心（請見低血糖症狀處理方法）。

■ 保存方法

- 儲存於室溫30 °C以下乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 將您的藥物提供給他人使用。

■ 發生低血糖該怎麼辦？

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
 1. 血糖值小於 70 mg/dL：立即服用 120-180 毫升果汁或糖果 8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
 2. 血糖值小於 50 mg/dL：立即服用 180-250 毫升果汁或糖果 10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
 3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
 4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

■ 發生高血糖該怎麼辦？

- 症狀：例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。
- 處理方式：請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 114.05
- PFS-7200-0144

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮