



由於心臟衰竭的病理機轉牽涉體內許多不同的代償機制，包含體內的神經系統及某些賀爾蒙的分泌，因此用藥的策略通常會採取多種藥物併用的方式，以有效抑制不同的代償機制。藥物不僅可以減輕症狀，長期服用可以延長壽命並維持心臟功能。因此即使症狀緩解，仍然需要持續服用。

## 治療期間之注意事項:

1. 建議每天定時測量心跳、血壓、體重，並確實紀錄供醫師參考。
2. 務必遵照醫師的指示服藥，切勿擅自停藥。
3. 請盡量避免使用中草藥，以減少藥物交互作用。
4. 若忘記服藥，想起時盡快服用；若想起時已接近下次服藥時間，則跳過一次，於下次服藥時間服用正常劑量，切勿一次服用雙倍劑量。

## 血管收縮素轉化酶抑制劑

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

Cabudan 卡布登

(Captopril 25mg)



Acertil 雅施達

(Perindopril 5mg)



### 使用目的

降低血壓，可減少心臟的負荷

### 副作用

乾咳、高血鉀、低血壓

### 其他注意事項

1. 服用後若嘴唇、眼睛或四肢出現水腫情形，請立即回診告知您的醫師。
2. 服用後若出現低血壓的症狀 (如頭暈眼花、疲累無力)，回診時請告知您的醫師。
3. 若腎功能差，使用時應注意鉀鹽的攝取。避免過度攝取高鉀食物(例如：香蕉、奇異果、堅果類、濃縮肉湯)。

## 血管收縮素接受體拮抗劑 & 血管張力素受體-中性溶酶抑制劑

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

<input type="checkbox"/> <b>Diovan 得安穩</b> (Valsartan 40mg) 	<input type="checkbox"/> <b>Diovan 得安穩</b> (Valsartan 160mg) 	<input type="checkbox"/> <b>Candis 康必舒</b> (Candesartan 8mg) 
<input type="checkbox"/> <b>Edarbi 易得平</b> (Azilsartan 40mg) 	<input type="checkbox"/> <b>Entresto 健安心</b> (Sacubitril/Valsartan 100mg) 	<input type="checkbox"/> <b>Entresto 健安心</b> (Sacubitril/Valsartan 200mg) 
<input type="checkbox"/> <b>Exforge 易安穩</b> (Amlodipine 5mg, Valsartan 160mg) 	<input type="checkbox"/> <b>Sevikar 舒脈康</b> (Amlodipine 5mg, Olmesartan 40mg) 	<input type="checkbox"/> <b>Sevikar HCT 舒脈優</b> (Olmesartan 40mg, Amlodipine 5mg, HCTZ 12.5mg) 

### 使用目的

降低血壓，可減少心臟的負荷 (健安心亦有排鈉利尿的作用)

### 副作用

高血鉀、低血壓

### 其他注意事項

1. 服用後若嘴唇、眼睛或四肢出現水腫情形，請立即回診。
2. 服用後若出現低血壓的症狀 (如頭暈眼花、疲累無力)，回診時請告知您的醫師。
3. 若腎功能差，使用時應注意鉀鹽的攝取。避免過度攝取高鉀食物(例如：香蕉、奇異果、堅果類、濃縮肉湯)。

## 乙型交感神經阻斷劑

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

**Concor 康肯**

(Bisoprolol 1.25mg)



**Biso 百適歐**

(Bisoprolol 5mg)



**Carvedilol Hexal 卡菲蒂羅**

(Carvedilol 6.25mg)



**Carvedilol Hexal 卡菲蒂羅**

(Carvedilol 25mg)



**Nebilet 耐比洛**

(Nebivolol 5mg)



### 使用目的

降低心跳及血壓，可減少心臟的負荷

### 副作用

心跳緩慢、四肢冰冷、低血壓、頭昏

### 其他注意事項

1. 若您有氣喘、慢性阻塞性肺病等肺部疾病，請告知您的醫師。
2. 服用後若出現低血壓或心跳過慢的症狀（如頭暈眼花、疲累無力），回診時請告知您的醫師。

## 醛固酮拮抗劑

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

**Spironolactone 使排通**

(Spironolactone 25mg)



**Inspra 迎甦心**

(Eplerenone 50mg)



**Kerendia 可申達**

(Finerenone 10mg)



**Kerendia 可申達**

(Finerenone 20mg)



### 使用目的

利尿、防止心臟纖維化 (可申達亦有保護腎臟、減少蛋白尿的作用)

### 副作用

高血鉀、男性乳房脹痛 (使排通)

### 其他注意事項

1. 此類藥物會增加血中鉀離子濃度，請避免使用含鉀的代鹽及過度攝取高鉀食物(例如：香蕉、奇異果、堅果類、濃縮肉湯)。
2. 若出現乳房脹痛情形，回診時請告知您的醫師。

## 鈉-葡萄糖共同轉運蛋白抑制劑

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

**Forxiga 福適佳**  
(Dapagliflozin 10mg)



**Jardiance 恩排糖**  
(Empagliflozin 10mg)



**Glyxambi 糖順平**  
(Empagliflozin 25mg, Linagliptin 5mg)



**Jardiance Duo 恩美糖**  
(Empagliflozin 12.5mg, Metformin 850mg)



### 使用目的

1. 排鈉利尿
2. 保護心血管，可降低心衰竭住院的風險以及死亡率
3. 保護腎臟，可預防腎臟病以及降低慢性腎臟病惡化的風險

### 副作用

低血壓、生殖器黴菌感染、泌尿道感染

### 其他注意事項

1. 發生下列症狀請立即就醫：高燒、排尿疼痛、無法解尿、血尿、生殖器部位疼痛。

## 環形利尿劑

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

**Furide 舒利諾**

(Furosemide 40mg)



使用目的

排除體內過多水分

副作用

口乾、頻尿、電解質不平衡

其他注意事項

1. 若有夜間頻尿情形，建議可提前至下午或晚餐前服用。

## If 離子電流選擇性抑制劑

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

**Coralan 康立來**

(Ivabradine 5mg)



**使用目的**

降低心跳，可減少心臟的負荷

**副作用**

心跳緩慢、視覺模糊或異常(看到發光球體)

**其他注意事項**

1. 請隨食物服用此藥，以增加藥物吸收率。
2. 服藥期間請避免喝葡萄柚汁。
3. 服用後若出現視覺改變或心跳過慢的症狀（如頭暈眼花、疲累無力），回診時請告知您的醫師。

## 毛地黃

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

**Lanoxin 隆我心**

(Digoxin 0.25 mg)



使用目的

增強心臟收縮功能

副作用

噁心、食慾不振、腹瀉、心跳過慢、視覺模糊或異常

其他注意事項

1. 服藥期間若出現心跳過慢、心律不整、視力模糊或視覺顏色改變(黃綠光)等症狀，請告知醫師。

## 可溶性鳥苷酸環化酶刺激劑

您目前所使用的藥品是 (打勾者):

Verquvo 偉卡沃  
(Vericiguat 5mg)



Verquvo 偉卡沃  
(Vericiguat 10 mg)



### 使用目的

可使血管及心肌細胞放鬆，改善心臟功能，並降低心衰竭住院的風險

### 副作用

低血壓、貧血

### 其他注意事項

1. 請隨食物服用此藥，以增加藥物吸收率。
2. 請勿使用威而鋼、樂威壯、犀利士等同類型藥品，因可能會增加低血壓的風險。
3. 服用後若出現低血壓的症狀 (如頭暈眼花、疲累無力)，回診時請告知您的醫師。