

藥品使用指導單

易克適®錠 (Ecoxia® 60 mg)

■ 藥品成分名

Etoricoxib

■ 藥品外觀

青蘋果形膜衣錠，標記：[E01]

■ 作用

骨關節炎、類風濕性關節炎之症狀的急慢性治療、急性痛風性關節炎、原發性經痛、僵直性脊椎炎、牙科術後疼痛、婦科術後疼痛。

■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量。
- 請於固定時間服用。

■ 注意事項

- 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內禁用本藥。
- 若您有肝腎功能不全、心血管疾病、預備懷孕、懷孕中或哺乳，應告知醫師。懷孕後期及哺乳中請避免使用。
- 用藥後若發生出血相關症狀，應先停藥，並聯絡醫療人員確認是否可繼續使用本藥。
- 需進行拔牙或相關手術前，請告知醫師。
- 本藥可能與其他藥物造成交互作用，若有進行其他藥物治療，請與醫師或藥師確認是否可併服。



■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況請勿驚慌：噁心、頭暈、腹脹等，一般情況下會逐漸緩和。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：呼吸困難、皮膚紅疹、異常出血（含腸胃道）、嘴唇、眼瞼、喉嚨出現腫脹或刺痛等。

■ 保存方法

- 儲存於室溫25°C以下乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 114.05
- PFS-7200-0155

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮