

藥品使用指導單

利肺[®]膠囊(Rina[®] 300/150mg)

■ 藥品成分名

Rifampicin, Isoniazid

■ 藥品外觀

深藍/深紅色膠囊，標記【Peili C03】

■ 作用

治療結核病

■ 用法

- 本藥須由醫師處方使用。通常需同時併用數種抗結核菌製劑，以降低結核菌產生抗藥性之機會，並增加結核病之治癒率。
- 劑量可能因人而異，請務必遵照醫囑使用完成療程。
為方便記憶，您可參考下列方式：
- 請盡可能在相同時間服藥（如：固定於每日早上刷牙後或睡前服藥）
- 每次服藥後，請在您的月曆或記事本上按照日期標上已服用過之記號
- 可利用市售之7日份藥盒，事先裝入您的藥物，再按星期別與時間服用。
- 本品常用劑量需依**體重**給予：
少於50公斤：依照醫師指示調整
50公斤(含)以上：每天一次服用2顆膠囊
- 利肺[®]膠囊應於餐前1小時或餐後2小時服用。

■ 注意事項

- 若對本品賦形劑或本品之任一成份過敏，請勿使用此藥。
- 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝、腎疾病、糖尿病、曾經接受過抗結核藥物治療者，及正服用其他藥物（包含處方藥、非處方藥、保健食品、中草藥等），請先告知醫師。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
- 若您本身有在服用制酸劑(例如：Strocain 息痛佳音錠、Tido 第得錠、Algitab艾胃逆服咀嚼錠等)，請與本藥間隔至少2小時服用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 注意事項

- 本品成分異菸鹼醯肼(Isoniazide)可能會引發周邊神經炎(手指、腳趾麻)。在營養不佳、酗酒及糖尿病病人較易發生，可併用維他命B6預防。
- 若服用藥物後出現疑似肝炎之症狀(例：疲憊、虛弱、厭食、噁心或嘔吐等)，請盡速聯絡您的醫師做後續評估。可以透過定期監測肝功能，測知肝炎的副作用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間12小時內，請跳過這一次，到下次正確服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 本品成分立汎黴素(Rifampin)可能會造成您的尿液、流汗、口水或糞便等體液呈橘紅色，此為正常現象請勿過度驚慌。
- 以下列舉之副作用並不是每一個人皆會發生，請勿過度驚慌：腹瀉、嘔吐、過敏反應(紅疹、搔癢、水腫、呼吸困難等)、視力模糊、發燒、喉嚨痛、寒顫、關節痛、四肢麻木疼痛、虛弱等。
- 若上述症狀持續且加重時，請盡速聯絡醫療人員或就醫評估。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.03
- PFS-7200-0199

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮