藥品使用指導單
瑞倍適®錠 (Rybelsus®3mg, 14mg)

■ 藥品成分名

Semaglutide

■ 藥品外觀

Rybelsus 3mg：白色至淺黃色橢圓形錠劑，標記：[3/novo]

Rybelsus 14mg：白色至淺黃色橢圓形錠劑，標記：[14/novo]

■ 作用

治療血糖控制不良的第二型糖尿病成人病人

■ 用法

每日一次，口服使用。本藥品應空腹服用，可在一天中任何時間服藥。

搭配少量水 (最多120 毫升)，應整顆吞服，不應剝開、壓碎或咀嚼。

服藥後應等待至少 30 分鐘再進食、喝水或服用其他口服藥物。

■ 注意事項

- 若您已知對此藥物過敏，請提前告知您的醫(藥)師。
- 若您本身或家族有髓質甲狀腺癌病史，或罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群，請提前告知您的醫(藥)師。
- 建議空腹服用，否則會降低此藥物的吸收。
- 此藥不耐濕氣和光線，尚未服用前請勿從鋁箔片中取出錠劑。
- 懷孕或哺乳期間不可使用。使用此藥期間建議避孕，計畫懷孕前至少兩個月應停用。
- 服用此藥可能發生噁心、腹瀉、嘔吐等胃腸不適症狀，改善方式有慢慢進食、少量進餐、避免油炸、油膩和太甜的食物。
- 如果與磺醯脲類藥物或胰島素併用時，可能增加發生低血糖的風險。發生低血糖時，請依低血糖處理原則，補充15克含糖食物。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果忘記用藥，則應跳過，第二天空腹再服用下一劑，勿服用雙倍藥劑。

■ 可能的副作用

- 噁心、腹瀉、食慾下降、脹氣。
- 低血糖，主要症狀：顫抖、心悸、冒冷汗、飢餓感。

■ 保存方法

- 此藥請於30℃以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 衛教影片

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
■ 制訂單位/日期：藥劑部 / 112.08
■ PFS-7200-0215

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。