

藥品使用指導單

甲美樂[®]錠 (Thimazol[®]5mg)

■ 藥品成分名

Methimazole

■ 藥品外觀

白色圓形錠劑，標記：【TC/中央刻痕】

■ 作用

治療甲狀腺機能亢進。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用。未經醫師同意，切勿自行停藥或改變劑量。

■ 注意事項

- 若您已知對此藥物過敏，請提前告知您的醫(藥)師。
- 若您計畫懷孕，或在服藥期間已懷孕，或正在哺乳，請告知醫師。
- 治療期間欲接種疫苗需請醫師評估。
- 如需動手術(包括牙科手術)、或其他緊急醫療處置，要將您正在服用的抗甲狀腺劑先告知醫師或牙醫。
- 如有服用碘及碘化物製劑、抗凝血劑、強心劑、抗心律不整劑、乙型交感神經阻斷劑，或肝功能不全者，請先告知醫師。
- 因此藥可能影響檢驗結果，做任何醫學檢驗前，請先告知醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 噁心、腸胃道不適、味覺異常、關節痛、肌肉痛。
- 本藥品可能引起顆粒性白血球減少症之副作用，若使用後有發燒與喉嚨痛的症狀，請即刻停止服藥且與醫師聯繫。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/112.08
- PFS-7200-0216

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮