

藥品使用指導單

捷抑炎®持續性藥效錠 (Xeljanz XR®11mg)

■ 藥品成分名

Tofacitinib

■ 藥品外觀

粉紅色橢圓形錠劑，標記【JKI 11】

■ 作用

治療類風濕性關節炎、乾癬性關節炎。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用。未經醫師同意切勿自行調整或停藥。
請完整吞服藥錠，不可壓碎、剝半或咀嚼。

■ 注意事項

- 若您已知對此藥物過敏，請提前告知您的醫(藥)師。
- 若您計畫懷孕，或在服藥期間已懷孕，或正在哺乳，請告知醫師。
- 如果您有腎臟或肝臟疾病、糖尿病、貧血、感染、白血球數低下、曾經感染過帶狀皰疹，或正在使用免疫抑制劑或皮質類固醇、近期有接種疫苗者，請事先告知醫師。
- 服藥期間避免攝取葡萄柚汁或葡萄柚。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 感染症、鼻咽炎、上呼吸道感染、頭痛、腹瀉、高血壓、膽固醇濃度上升等。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏、嚴重感染、帶狀皰疹、皮膚腫塊、心跳異常、肝臟酵素升高等。

■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/112.09
- PFS-7200-0217

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

