

藥品使用指導單

富能[®]錠 (Florinef[®] 0.1mg)

■ 藥品成分名

Fludrocortisone

■ 藥品外觀

白色，雙凸圓形，錠劑；大小：0.65公分；標記：[FT01]

■ 作用

部份取代治療愛迪生氏疾病原發性及繼續性腎上腺皮質不足；治療鹽類流失之腎上腺增殖症狀。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，未經醫師同意切勿自行調整或停藥。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對Florinef成分有過敏反應、懷孕或哺乳、心臟疾病、腎臟或肝臟疾病、骨質疏鬆症、高血壓、糖尿病等。
- 服藥期間，如果要使用其他藥品（包括非處方用藥、健康食品、中草藥、進行疫苗接種等），應先諮詢您的醫師及藥師。
- 長期治療時，應定期追蹤血中電解質數值，飲食中應避免攝取過多鈉，且鉀的補充可能是需要的。
- 長期治療時，建議攝取適量的蛋白質。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間，請直接服用下次之劑量即可。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：水腫、腸胃不適、傷口癒合能力差、肌肉痛、視覺模糊或其他視力障礙症狀、高血壓、高血糖等。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應(癢或起疹、胸悶、呼吸困難)、嚴重或持續性頭痛、腳掌或大腿腫脹或異常體重增加。

■ 保存方法

- 藥品請在密閉容器中置於冷藏2-8℃避光保存；避免接觸高溫。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.01
- PFS-7200-0219

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮