

藥品使用指導單

可申達®錠 (Kerendia® 10mg, 20mg)

■ 藥品成分名

Finerenone

■ 藥品外觀

Kerendia 10mg: 粉紅色橢圓形膜衣錠，標記：[FI/10]

Kerendia 20mg: 黃色橢圓形膜衣錠，標記：[FI/20]

■ 作用

降低第二型糖尿病合併慢性腎臟病病人之心、腎事件風險。

■ 用法

- 醫師會根據血清鉀濃度及估計之腎絲球過濾速率(eGFR)判定起始劑量。
- 請遵照醫師處方之藥量每天服用一次，不可任意更改劑量。
- 可於飯前或飯後服用。無法以口吞服整粒藥錠的病人，本藥品可磨碎後與水或軟質食物(如蘋果泥)混合後立即服用。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：患有腎上腺功能不全、有懷孕或哺乳、重度肝功能不全、接受特定藥物治療，如：Itraconazole，Ketoconazole，Ritonavir，Nelfinavir，Cobicistat，Clarithromycin，Telithromycin，Nefazodone。
- 此藥品與特定藥品有交互作用(例如CYP3A4抑制劑或誘導劑)，使用前請主動告知醫師或藥師您正在服用的藥品。
- 服藥期間，避免併服葡萄柚或葡萄柚汁。
- Kerendia 可能導致高血鉀症，避免使用過多含鉀食物(如香蕉、柑橘)。
- 在接受Kerendia治療期間，建議具生育能力的女性應使用有效的避孕措施。
- 開始用藥、重新用藥或調整劑量四週後，皆需測量血清鉀濃度，避免併服鉀補充品、保鉀型利尿劑(例如：Amiloride、Triamterene)以及其他礦物性皮質素受體拮抗劑(MRAs)(例如：Eplerenone、Spironolactone)。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

高血鉀(疲倦、全身無力、臉、舌、手腳發麻)、低血壓(頭暈眼花、疲累、四肢冰冷、注意力不集中)、低血鈉(頭痛、昏睡、神智不清、感覺遲鈍)。
若發生上述情形，請立即告知醫師。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.01
- PFS-7200-0220

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮