

藥品使用指導單

雙革糖®膜衣錠 (Lodigit®15/850mg)

■ 藥品成分名

Pioglitazone/Metformin

■ 藥品外觀

白色長橢圓形錠劑，標記：[SCP/976]

■ 作用

用於已在接受Pioglitazone和Metformin合併治療者，或僅使用Metformin但血糖控制不佳之第二型糖尿病患者的血糖控制。

■ 用法

請依照醫師指示隨餐服用，以減少與Metformin有關的腸胃副作用。

■ 注意事項

- 第二型糖尿病的治療也應包含飲食控制和規律運動，必要時減重，才能有效控制糖尿病。
- **雙革糖®膜衣錠**不建議使用於有心臟衰竭症狀、嚴重腎功能不全、代謝性酸中毒，包括糖尿病酮酸症，和需注射含碘顯影劑的患者。用藥前若有以上情形，請先告知醫師。
- 開始使用**雙革糖®膜衣錠**治療前應先進行肝臟功能監測，且此後定期做監測。
- 服藥期間，如果您預備懷孕、已經懷孕、哺乳，或需服用其他藥品（包含處方藥、非處方藥、保健食品、中草藥等），應先諮詢醫師或藥師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：
腹瀉、噁心、頭痛、泌尿道感染、鼻竇炎、暈眩、下肢水腫。
- 治療期間如發生肌肉痛、倦怠、不尋常的睏倦、體重不尋常快速增加、呼吸急促或其他心臟衰竭症狀，請立即回診告知醫生。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 發生低血糖該怎麼辦？

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
- 血糖值小於 70 mg/dl：應立即進食含 15 公克易吸收含有糖份的食品，如含糖飲料或果汁 150 mL、3 顆方糖、2 包糖包、1 大匙蜂蜜、2 大匙葡萄乾、葡萄糖錠 3 顆。
- 15 分鐘後測量血糖，若血糖沒有上升或症狀未改善，可再吃一次 15 公克易吸收含有糖份之食品（同上）；若低血糖症狀一直沒有改善，則應立刻送醫治療。
- 如症狀改善，但距離下一餐還有一小時以上，建議喝一杯(240 mL)牛奶或食用一份點心避免再度發生低血糖。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 114.05
- PFS-7200-0221

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮