

藥品使用指導單

愛憶欣®口崩錠(Aricept®10mg)

■ 藥品成分名

Donepezil

■ 藥品外觀

黃色圓形錠劑，標記【ARICEPT 10】

■ 作用

治療阿茲海默症。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，未經醫師同意切勿自行調整或停藥。

應於晚上服用。可單獨服用或與食物一起服用。

將藥錠放置於舌頭上，崩散後再用水配服。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：
曾對Aricept其成分有過敏反應、有消化性潰瘍、慢性阻塞性肺病或氣喘、癲癇病史、排尿困難、懷孕及哺乳。
- 本藥可能使胃腸分泌增加，應小心觀察是否有急性或隱藏性胃腸道出血，尤其是有胃潰瘍病史，或同時併服非類固醇抗發炎藥物(NSAID)之病人。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿一次或短期間服用兩次劑量。

■ 可能的副作用

- 噁心、嘔吐、腹瀉、失眠、頭痛、暈眩、肌肉痙攣、肌肉無力、倦怠與食慾減退，症狀通常輕微且短暫，可能會於持續服藥1-3週後緩解。如果上述症狀發生一段時間後仍持續惡化，請盡快通知醫師。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應(癢或起疹、臉或手部紅腫、嘴巴或喉嚨紅腫或刺痛、胸悶、呼吸困難)。

■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.03
- PFS-7200-

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮