

藥品使用指導單

匹井梭安[®]錠(Pyrazinamide[®]500mg)

■ 藥品成分名

Pyrazinamide

■ 藥品外觀

白色圓扁形錠劑，標記：[P]

■ 作用

肺結核及其他之結核症。

■ 用法

- 本藥須由醫師處方使用。建議於每日固定時間或依醫師指示每日分次服用，確實完成療程。
- 通常需同時併用數種抗結核菌製劑，以降低結核菌產生抗藥性之機會，並增加結核病之治癒率。
- 為方便記憶，您可參考下列方式：
請盡可能在相同時間服藥（如：固定於每日早上刷牙後或睡前服藥）
每次服藥後，請在您的月曆或記事本上按照日期標上已服用過之記號
可利用市售之7日份藥盒，事先裝入您的藥物，再按星期別與時間服用。

■ 注意事項

- 若對本品賦形劑或本品成份過敏，請勿使用此藥。
- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：懷孕或計畫懷孕、哺乳，原先診斷有腎臟疾病、肝臟疾病、糖尿病、痛風病史，及正服用其他藥物（包含處方藥、非處方藥、保健食品、中草藥等）。
- 應儘量避免不必要或長時間曝曬在陽光下，並且要穿具有保護作用的衣服或戴太陽眼鏡及塗抹防曬乳液，因為此藥會使你的皮膚對陽光敏感。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若忘記服藥應於記起時立即服用。若很接近下一次服藥時間，則跳過忘記的劑量，並待下次正確服藥時間再服用。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 本品可能造成頭痛、肌肉痠痛、皮膚色素沉著等情形，若造成療程影響，請回診與您的處方醫師討論。
- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：食慾不振、噁心或嘔吐、關節部位紅腫疼痛。
- 若發生下列情形，請立即回診告知醫師：發熱、發疹等過敏症狀、皮膚或眼睛變黃、尿液顏色變深、異常出血或淤血、排尿困難。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.03
- PFS-7200-0223

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

