

藥品使用指導單

適潰瘍®錠(Splotin®50mg)

■ 藥品成分名

Sulpiride

■ 藥品外觀

藍色圓扁型錠劑，特殊符號標記

■ 作用

用於精神疾病狀態或消化性潰瘍

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫師指示服用。

■ 注意事項

- 疑似有嗜鉻細胞瘤患者請勿使用此藥品，可能會引起血壓急劇上升。
- 如果您預備懷孕、已經懷孕或需哺乳，應先諮詢醫（藥）師評估是否適合繼續使用此藥品。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥等），應先諮詢醫（藥）師。
- 服用此藥品可能有嗜睡副作用，不建議開車或從事危險機械操作。
- 本藥品因有止吐作用，所以可能會使因其他藥劑造成的中毒、腸阻塞、腦瘤等引起的嘔吐症狀變不明顯，需嚴密觀察謹慎使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：噁心、嘔吐、口渴、便秘、嗜睡、暈眩、排尿困難。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應（癢或起疹、臉或手部紅腫）、震顫、肌肉僵硬、男性女乳症。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C 以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.03
- PFS-7200-0224

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮