

# 藥品使用指導單

## 異位寧<sup>®</sup>錠 (Visanne<sup>®</sup>2mg)

### ■ 藥品成分名

Dienogest

### ■ 藥品外觀

白色至灰白色、圓形、平面錠劑，直徑為7mm，標記：[B]

### ■ 作用

治療子宮內膜異位症伴隨之骨盆腔疼痛。

### ■ 用法

- 每天同一時間服藥一錠，可於飯前或飯後服用。
- 當服完一份包裝的藥物後，應開始服用下一份藥物，不可中斷。
- 可於月經週期的任一天開始服藥，或遵照醫師處方服用。

### ■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對Visanne其成分有過敏反應、懷孕或哺乳、肝、腎、心血管疾病、靜脈栓塞、糖尿病、未經診斷的陰道出血、性荷爾蒙相關腫瘤。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品(包括非處方用藥、保健食品、中草藥等)，應先諮詢醫(藥)師。
- 服藥期間，無論是否發生陰道出血，均必須持續服藥。
- 任何的荷爾蒙避孕法均必須在開始Visanne治療前停用。若有避孕需要，應使用非荷爾蒙類的避孕方法(例如：阻隔式避孕)。
- 若於青少女與成年早期階段服用此藥，需特別注意骨質密度是否降低。
- 所有年齡的女性均應自飲食或補充劑中攝取足量的鈣質和維生素D。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若漏服藥錠，或於服藥後3-4小時內發生嘔吐或腹瀉，可能會降低療效。
- 如果漏服藥錠，應於想起來時儘快補服一顆，並於隔天依照平常的時間繼續服藥。
- 如果服藥後3-4小時內發生嘔吐或腹瀉，同樣也應補服一顆藥錠。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 副作用較常出現於開始服藥後第一個月，隨著治療時間而消退。
- 如果下列副作用持續發生，請通知醫師：頭痛、乳房不適、腸胃不適、情緒低落、青春痘、經期出血型態改變(如不規則出血、無月經)。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應(搔癢、紅疹等)、持續嚴重出血、高血壓、黃疸。

## ■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.01
- PFS-7200-0226

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

