

藥品使用指導單

拿百磷[®]膠囊(Nephoxil[®]500mg)

■ 藥品成分名

Ferric Citrate

■ 藥品外觀

暗紅色膠囊

■ 作用

檸檬酸鐵在胃腸道結合食物中的磷，進而避免磷吸收，為控制接受血液透析治療的成年慢性腎病患者之高磷血症。

■ 用法

每日三次隨餐或餐後立即整粒吞服。請遵照醫師處方之用法及劑量服用，未經醫師同意切勿自行調整藥物。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：低血磷症狀、對本藥品內含成份及檸檬酸鐵過敏、鐵代謝異常及鐵過多症狀（例如血色素沉著症）。
- 若是懷孕、計畫懷孕、哺乳或曾患有腸胃道疾病、對口服含鐵製劑過敏、貧血、心臟疾病、肝臟疾病等相關疾病，請事先告知您的醫師。
- 使用時需整粒吞服，不應剝開或磨碎。
- 本藥品與其他藥品併服可能產生藥物交互作用。服藥期間，如果要服用其他藥品（包含處方藥、非處方藥、維他命、保健食品、中草藥等），應先諮詢醫師或藥師。
- 服用本藥品時，請勿與含鋁製劑、茶、咖啡、牛奶一起使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果您於主餐中忘記服用，可於餐後一小時內服用；但如果已超過一小時，就不需要再補服藥品，等到下一餐時再服用即可。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請告知醫師：
糞便變色(黑色)、便秘、腹瀉、腹痛、腹脹、上呼吸道發炎、頭暈、噁心、嘔吐、咳嗽。
- 若發生下列情形，請立即回診：過敏反應(皮膚紅疹、臉或手部紅腫、嘴巴或喉嚨紅腫或刺痛、胸悶、呼吸困難)。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.03
- PFS-7200-0227

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮