

藥品使用指導單

律博克®錠(Tambocor®100mg)

■ 藥品成分名

Flecainide acetate

■ 藥品外觀

白色圓形錠劑；標記：[3M；TR 100]

■ 作用

減慢心臟傳導速率，用於治療心律不整。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫師醫囑服用。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對有效成分 flecainide 過敏、心肌梗塞、心衰竭、嚴重肝臟功能受損、同時有在服用毛地黃 (digoxin) 強心劑或是心律不整藥品臧得樂 (amiodarone)。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥等），應先諮詢醫（藥）師。
- 如果您預備懷孕、已經懷孕或需哺乳，應先諮詢醫（藥）師評估是否適合繼續使用此藥品。
- 牛奶類製品可能會增加此藥物的暴露量，建議間隔兩小時使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：便秘、腹瀉、噁心、嘔吐、眩暈、頭昏、頭重腳輕、視力模糊。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：呼吸困難、運動失調、周邊神經感覺異常。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.03
- PFS-7200-0228

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮