

藥品使用指導單

得抑血[®]錠(Tranexam[®]250mg)

■ 藥品成分名

Tranexamic acid

■ 藥品外觀

白色圓形錠劑；標記：[JCP]

■ 作用

使體內發炎症狀消失及維持正常血液凝固機能，用於全身及局部出血或出血性疾病。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫師醫囑服用。

通常成人每次1-2粒，每天3-4次。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對 Tranexam 其成分有過敏反應、血栓（腦血栓、心肌梗塞、血栓靜脈炎）患者、消耗性凝固障礙患者。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等），應先諮詢醫（藥）師。
- 本藥品含有阿斯巴甜賦形劑，苯酮尿症患者不宜使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：食慾不振、噁心、下痢、胸燒感、嗜睡。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應（搔癢感或起疹）。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.10
- PFS-7200-0229

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮