

藥品使用指導單

日舒[®]錠(Zithromax[®]250mg)

■ 藥品成分名

Azithromycin

■ 藥品外觀

白色橢圓形錠劑；標記：[Pfizer][ZTM 250]

■ 作用

此藥為抗生素，可治療革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染(支氣管炎及肺炎)、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染(急性咽炎、鼻竇炎、扁桃腺炎)和性傳染病等。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫囑服用。
應每天使用一次，可與食物併服。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對 Azithromycin、紅黴素或其他巨環類抗生素產生過敏症狀；患有重症肌無力、肝腎功能障礙、心律不整、電解質不平衡(低血鉀或低血鎂)等疾病。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品(包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等)，應先諮詢醫(藥)師，特別是抗心律不整、抗精神病藥物、抗憂鬱劑、fluoroquinolones類抗生素及強心劑(Digoxin)。
- 如果您預備懷孕、已經懷孕或需哺乳，應先諮詢醫(藥)師，評估是否適合繼續使用此藥品。
- 抗生素需服用完整個療程，切勿自行停藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐、軟便、腹脹、頭痛、眩暈與嗜睡。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應（皮膚紅疹、搔癢、水腫）、心悸、黃疸。

■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.10
- PFS-7200-0230

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮