

藥品使用指導單

能得爽®緩釋膠囊(Nakasser®120mg)

■ 藥品成分名

Diltiazem HCl

■ 藥品外觀

白色膠囊，標記【N.K.P.371】

■ 作用

治療狹心症、高血壓

■ 用法

- 需由醫師處方使用。本藥為緩釋膠囊，須整顆吞服，不可剝開。
- 未經醫師同意切勿自行調整或停藥。

■ 注意事項

- 有下列病情的患者，禁止服用本品：病竇症候群(**Sick sinus syndrome**)、中至重度房室傳導阻斷(**AV block**)、嚴重低血壓(收縮壓小於**90 mmHg**)、急性心肌梗塞或肺充血。
- 建議避免對哺乳中的婦女投藥，但無法避免仍須投藥時，必須停止哺乳。
- 本藥並不能阻止急性狹心症發作。
- 治療高血壓時，必須定期檢查及記錄血壓與心跳。
- 服用本藥期間請勿飲酒，並應盡量避免喝葡萄柚汁或吃葡萄柚。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 一般而言，Diltiazem很少有副作用，即使有副作用，也是輕微的。
- 較常見的副作用：腳踝水腫、頭痛、噁心、眩暈、疲倦感、心跳徐緩。
- 罕見但嚴重之副作用：肝指數上升所導致的肝功能障礙或黃疸；出現紅斑、水泡、膿皰、搔癢、發熱、黏膜疹等情形時，必須停止用藥，並立即回診。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.04
- PFS-7200-0233

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮