

藥品使用指導單

頗得斯安®持續性藥效顆粒劑 (Pentasa P.R granules® 2g)

■ 藥品成分名

Mesalazine

■ 藥品外觀

鋁箔小包裝；灰白色至淡棕白色顆粒。

■ 作用

治療潰瘍性結腸炎。

■ 用法

- 應直接將小包內的顆粒劑倒在舌頭上，用水或果汁吞服。
- 亦可以將小包內的顆粒劑與優格混合並立即食用。
- 請不要嚼碎或磨粉。

■ 注意事項

- 曾對乙醯水楊酸及其他水楊酸成分過敏者不能使用。
- 當出現腹痛、發燒、劇烈頭痛、嚴重皮膚反應的症狀（例如皮疹）、黏膜病變或任何其他過敏反應症狀時，應立即停止治療。
- 服用此藥物期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等），應先諮詢醫（藥）師。
- 肝腎功能不佳者，需小心使用。使用本品治療前都要先評估肝腎功能，並在治療期間定期追蹤。
- 如果您預備懷孕、已經懷孕或需哺乳，應先諮詢醫（藥）師評估是否適合繼續使用此藥品。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 腹瀉、噁心、腹痛、頭痛、嘔吐、便秘、鼻咽發炎。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏、發燒。

■ 保存方法

- 在原包裝內儲存於30°C以下，避光保存。
- 請勿冷凍。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.02
- PFS-7200-0234

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮