

藥品使用指導單

安瑞福®持續性藥效膠囊(Advagraf®1mg,5mg)

■ 藥品成分名

Tacrolimus (FK506)

■ 藥品外觀

1mg：白/橘色，硬膠囊；標記：[1mg；677]

5mg：淡紅/橘色，硬膠囊；標記：[5mg；687]

■ 作用

成人肝、腎移植之第一線用藥，或Cyclosporin無效之第二線用藥

■ 用法

本藥是一天一次的口服劑型。建議在每天早上服用一次，膠囊應以液體整粒吞服（最好是水）。

安瑞福®持續性藥效膠囊應空腹服用，或者至少在飯前1小時或飯後2-3小時服用，以達到最大吸收。

■ 注意事項

- 必須定期抽血確認藥物血中濃度。
- 請勿自行增減藥品用量，因為可能導致移植排斥或不良反應的發生率增加，包括免疫抑制不足或抑制過度。
- 服藥期間避免食用葡萄柚或葡萄柚汁，以免增加藥物血中濃度，並增加嚴重不良反應的風險。
- 服藥期間，請主動告知醫師或藥師您正在服用的其他藥物。未經醫師同意，請勿自行服用其他中草藥、維他命或非處方藥物。
- 服藥期間免疫力受到抑制，應避免出入人潮多的地方、接觸有感冒或其他感染症的人，並注意個人衛生。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫師及藥師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果早上忘記服藥，應儘快在當天補服。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 副作用的發生因人而異，若有以下情形，請告訴醫師或藥師：手部顫抖、血壓上升、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、失眠、掉髮等。
- 若服藥後出現過敏反應（呼吸困難、臉部腫脹）、異常瘀青或出血、排尿減少或疼痛、發燒、感覺異常等症狀，請立即就醫。

■ 保存方法

- 此藥請儲存於30°C以下，並保存在原包裝內以免受潮。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.04
- PFS-7200-0235

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮