

藥品使用指導單

安滿達®膜衣錠 (Amanda®100mg)

■ 藥品成分名

Amantadine

■ 藥品外觀

橘色圓凸形錠劑；標記：[WD]

■ 作用

治療巴金森病；預防及治療A型流行性感冒症狀。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫師醫囑服用，勿自行調整或停藥。

■ 注意事項

- 此藥物可能會引起中樞神經系統反應或視線模糊，需從事高危險機械工作或駕駛者需小心。
- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對 Amantadine 其成分有過敏反應、癲癇病史、骨質疏鬆、充血性心衰竭、週邊水腫、靜脈栓塞、肝腎功能不全或姿勢性低血壓。
- 如果您預備懷孕、已經懷孕或需哺乳，應先諮詢醫（藥）師評估是否適合繼續使用此藥品。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等），應先諮詢醫（藥）師。
- 使用本藥品時不建議與酒精類飲品併服。
- 服用此藥品的巴金森病患者請勿自行停藥，以免因驟停使疾病加速惡化。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：情緒低落、緊張、煩躁不安，尿滯留、便秘、噁心、嘔吐、眩暈、水腫、頭痛、疲倦、失眠、多汗、背痛。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：呼吸困難、皮膚疹。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 114.02
- PFS-7200-0236

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮