

藥品使用指導單

黴特克舒[®]錠 (Fungitech[®] 250mg)

■ 藥品成分名

Terbinafine HCl

■ 藥品外觀

白色，圓扁型錠劑，中央刻痕

■ 作用

治療黴菌感染

■ 用法

本藥須由醫師處方使用。切勿自行調整或停藥。口服此藥品，藥物會集中皮膚、頭髮、指甲上而達到殺黴菌作用。治療期依感染程度而不同。

■ 注意事項

- 對Terbinafine過敏者，禁止服用此藥。
- 本品只用在外用治療無法使用時，並應在用藥前後檢查肝功能。
- 若您準備懷孕、已懷孕或正在授乳，請告知您的醫師。
- 此藥物會被促進代謝的藥物（如Rifampicin）影響，若有疑問，可諮詢醫師（藥師）您有在服用的其他藥品。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若距離下次用藥時間不到4小時，則跳過錯過的劑量，按您的常規用藥時間表用藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 一般輕微副作用：胃腸方面如飽脹、噁心、消化不良、食慾降低。
- 不常見的副作用：味覺異常、視覺改變。
- 如果被檢測出肝功能異常，或出現疲倦、皮膚眼白泛黃、茶色尿，大便顯色蒼白，嚴重皮膚壞死及過敏反應，則停止使用本藥品，請立即回診。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.02
- PFS-7200-0237

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮