

藥品使用指導單

心舒平[®]持續性膜衣錠(Isoptin[®]240mg)

■ 藥品成分名

Verapamil

■ 藥品外觀

淡黃色長圓柱形錠劑；標記：[雙三角形]

■ 作用

為一種鈣離子阻斷劑，用於治療高血壓、心絞痛、心律不整。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫囑，與食物併服，不可壓碎或磨粉。

■ 注意事項

- 服用此藥物可能會影響反應速度或感到暈眩，而影響駕駛、操作機器的安全性，服藥期間應特別注意。
- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對 Verapamil 其成分有過敏反應、重度肝腎功能不全、心因性休克、心衰竭、低血壓或心搏徐緩患者。
- 本藥品與其他藥品併服可能產生藥物交互作用。服藥期間，如果要服用其他藥品（包括處方藥、非處方藥、健康食品、中草藥等），應先諮詢醫師或藥師。
- 如果您預備懷孕、已經懷孕或需哺乳，應先諮詢醫師或藥師評估是否適合繼續使用此藥品。
- 服藥期間應避免服用葡萄柚汁和酒精，以免有相關交互作用產生。
- 服藥期間應每天規律性的測量脈搏與血壓。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：頭痛、眩暈、便秘、噁心、面潮紅、低血壓、周邊水腫、疲勞。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：下肢嚴重水腫、呼吸困難、體重突然上升、心悸及胸痛之症狀嚴重或持續時間增加、過敏反應（搔癢感或起疹）、癲癇、男性女乳症。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.04
- PFS-7200-0238

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

