

# 藥品使用指導單

## 睦體康<sup>®</sup>腸衣錠(Myfortic<sup>®</sup>180mg)

### ■ 藥品成分名

Mycophenolic acid

### ■ 藥品外觀

淡綠色圓形錠劑；標記：[C]

### ■ 作用

免疫抑制調節劑，常用於腎臟移植後預防排斥。

### ■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫師醫囑服用。可空腹或和食物併用，但需固定時間服用。需整粒吞服，不能剝半或磨粉。

### ■ 注意事項

- 開始使用藥物前一個禮拜內一定要測試確定未懷孕，且使用此藥品前4個星期開始需避孕，直到停藥後6個星期。
- 本藥品為一特定酵素抑制劑，若有罕見遺傳性疾病如 kelley-seegmiller syndrome 或是 lesch-nyhan syndrome 請先告知醫師。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗等），應先諮詢醫（藥）師。
- 如果您預備懷孕、已經懷孕或需哺乳，應先諮詢醫（藥）師評估是否適合繼續使用此藥品。
- 服用本藥物建議做好防曬措施，減少日光和紫外光的照射以避免皮膚病變的風險。
- 服用本藥物期間若有任何感染跡象、意外的挫傷、出血等任何徵兆請馬上告知醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：頭痛、腹瀉、腹痛、便秘、噁心嘔吐、胃脹氣、咳嗽、發燒、疲勞、呼吸道感染。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：呼吸困難、皮膚疹。

## ■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.06
- PFS-7200-0239

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

