

藥品使用指導單

立泛黴素[®]膠囊(Rifampicin[®]capsule 300mg)

■ 藥品成分名

Rifampicin

■ 藥品外觀

咖啡色膠囊，標記【KJ 190】

■ 作用

肺結核、奈瑟氏腦膜炎球菌帶原者的抗感染用藥

■ 用法

本藥須由醫師處方使用。未經醫師指示，不可自行調整劑量或服藥次數。最好在空腹(飯前1小時，或飯後2小時)與一大杯水(240ml)共服，以獲得最佳的吸收。但若發生胃腸道刺激時，可以與食物同服。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對Rifampicin其成分過敏、懷孕或哺乳、肝、腎、心臟疾病、糖尿病、黃疸。
- 患有酒精中毒及肝臟功能不全的病人，本藥之使用應小心考慮。
- 本藥若每日與酒精併用，可能會導致Rifampicin誘生性肝臟毒性之增加，並加速Rifampicin本身的代謝。因此，Rifampicin劑量可能需要調整，且應密切監視肝臟毒性的徵兆。
- 本藥與其他藥物較容易產生交互作用。服藥期間，如果有服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗等），應先諮詢醫師或藥師。
- 服藥後可能會讓您感覺嗜睡，請盡量避免從事需全神貫注或可能造成危險之相關活動，如開車、操作機械等。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

如下列副作用發生一段時間並持續惡化，請盡快通知醫師：

- 寒慄、呼吸困難、暈眩、頭痛、肌肉及骨骼疼痛、顫抖、發熱
- 排尿次數或尿量大為降低
- 食慾不振、噁心、異常的疲倦衰弱、嘔吐
- 咽喉痛、異常瘀傷或出血以及眼睛或皮膚變黃
- 尿液、糞便、唾液、痰、汗及淚液等由紅橙色變為深紅棕色
- 胃痙攣、搔癢、皮膚疹、紅腫
- 唇部或舌頭疼痛

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.06
- PFS-7200-0240

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮