

藥品使用指導單

意妥明[®]錠(Etumine[®]40mg)

■ 藥品成分名

Clotiapine

■ 藥品外觀

白色、圓形、錠劑，有刻痕

■ 作用

調整精神狀態，治療思覺失調症、攻擊或過動、睡眠障礙、酒精或藥癮後之戒斷症等有關之焦慮、恐慌狀態。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用。

醫師將視個人狀況調整用量，治療初期：每日120-200毫克，維持及長期治療：每日20-160毫克；分成2至3次服藥。請勿自行停藥或調整用量。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對Etumine其成分有過敏反應、懷孕或哺乳、前列腺肥大、狹角性青光眼、糖尿病、癲癇、腦損傷、中風、失智症、肝、腎、心臟或肺部疾病。
- 本藥品與其他藥品併服可能產生藥物交互作用。在服藥期間，如果需服用其他藥品（包含處方藥、非處方藥、保健食品、中草藥等，特別是鋰鹽、精神科藥物或抗癲癇藥物），應先諮詢醫師或藥師。
- 服用藥品期間請勿飲酒。
- 服藥後可能會讓您感覺嗜睡、視覺模糊，請盡量避免從事需全神貫注或可能造成危險之相關活動，如開車、操作機械等。
- 老年人在服藥期間較易出現低血壓，建議規律地監測血壓。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若忘記服藥應於記起時立即服用。若很接近下一次服藥時間，則跳過忘記的劑量，並待下次正確服藥時間再服藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：姿態性低血壓、心悸、口乾、便秘、視覺模糊、嗜睡、混亂、激動、肌張力不足、靜坐不能等。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應(癢或起疹、臉或手部紅腫、嘴巴或喉嚨紅腫或刺痛、胸悶、呼吸困難)

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/113.05
- PFS-7200-0241

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

