

# 藥品使用指導單

## 黛麗安<sup>®</sup>糖衣錠(Diane-35<sup>®</sup> 2mg/0.035mg)

### ■ 藥品成分名

Cyproterone 2 mg + Ethinylestradiol 0.035 mg

### ■ 藥品外觀

米黃色，雙凸面圓形糖衣錠

### ■ 作用

用於生育年齡婦女治療中度至重度且對雄性素敏感的痤瘡或多毛症。  
用於痤瘡的治療，應於局部治療或全身抗生素治療失敗時才可使用。  
本藥品也是一種荷爾蒙避孕藥，但不應與其他荷爾蒙避孕藥併用。

### ■ 用法

- 依照包裝上的指示，每天於同一時間以適量開水吞服。
- 每日一錠，連續21天。經過七天不服藥，再開始服用下一包，通常在此七天內會出現消退性出血。一般會在服用完最後一顆藥的2-3天左右出現，開始服用下一包時可能都還未結束。
- 請遵照醫師指示服藥。

### ■ 注意事項

- 若您有以下情形，請主動告知您的醫(藥)師：靜脈或動脈血栓病史、嚴重高血壓、糖尿病併有血管症狀、肝臟疾病、疑似有惡性腫瘤、不明原因的陰道出血、已懷孕或正在授乳、偏頭痛病史、腦膜瘤病史、對本品主成分或賦形劑過敏。
- 以下情況應立即停藥：偏頭痛頻率或嚴重程度增加、視力或聽覺突然模糊、出現血栓徵兆(如腿部異常疼痛或腫脹)、胸悶或胸痛、臉部、手臂或腿部無力或麻木、出現黃疸、全身搔癢、血壓明顯上升、上腹部劇烈疼痛。
- 開始使用前須排除懷孕可能性，使用期間若發生嚴重腸胃不適可能影響藥品吸收。
- 本品可能與其他藥物產生交互作用，治療開始前請告知醫師所有您正在使用的處方、非處方藥物、保健食品、中草藥等。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 忘記服藥時，如果在12小時內補服，避孕效果並不會降低。故想起時應儘早補服，下一劑仍在正常時間服用。
- 如果超過12小時忘了服藥，避孕效果可能降低，可依照下列規則處理忘記服藥的情形，處理的基本原則是：
  - 不得連續7天或7天以上漏服藥錠。
  - 連續7天未間斷的服藥才能充分達到抑制效果。

## ■ 可能的副作用

- 常見的副作用：噁心、腹痛、體重增加、頭痛、情緒低落、情緒改變、乳房疼痛、乳房觸痛。
- 其他不常見的副作用：嘔吐、腹瀉、體重減少、體液滯留、性慾降低或增強、乳房肥大、陰道分泌物增加、乳頭分泌物。
- 如果開始服用黛麗安後出現任何讓您困擾的症狀，請停用黛麗安並立刻與您的醫療人員聯絡。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於15-30°C)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 113.12
- PFS-7200-0244

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

