

藥品使用指導單

敵庖治[®]錠 (Acylete[®] 400mg)

■ 藥品成分名

Acyclovir

■ 藥品外觀

淡橘色不規則六邊形；標記：[CCP]

■ 作用

治療帶狀疱疹病毒引起之感染、單純疱疹病毒引起之皮膚及粘膜感染和水痘感染，或是預防骨髓移植及白血病患者引起免疫不全病人之單純疱疹感染。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用。請依照醫囑服用並完成整個療程，不可自行停藥。若醫囑為每日服用5次，應以4小時的間隔服用，夜晚時的一次可略去。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：腎功能不全、曾對 Acylete 成分有過敏反應、懷孕或哺乳、服用藥物 Probenecid。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品，包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗等，應先諮詢醫(藥)師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果您於主餐中忘記服用，可於餐後一小時內服用；但如果已超過一小時，就不需要再補服藥品，等到下一餐時再服用即可。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：噁心、嘔吐、腹瀉和腹部疼痛。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應(皮疹)。

■ 保存方法

- 此藥請於室溫、乾燥、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.02
- PFS-7200-0245

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮