

藥品使用指導單

安立復®錠 (Abilify®10mg)

■ 藥品成分名

Aripiprazole

■ 藥品外觀

粉紅色，橢圓形，錠劑；標記：[A-008][10]

■ 作用

情緒調整，可用於治療躁動症狀，亦可作為重鬱症之輔助治療。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫囑使用，切勿自行增減藥量或停藥。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：先前曾對Aripiprazole或其任何成分出現過敏、失智症、中風、心臟血管疾病、癲癇、吞嚥困難、計畫懷孕、已懷孕或正在哺乳。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等；特別是降血壓藥物），應先諮詢醫（藥）師。
- 服藥後可能會產生低血壓，在尚未確認您對這類藥物的反應前，請盡量避免從事需全神貫注或可能造成危險之相關活動，如開車、操作機械等。
- 服藥期間請勿飲酒。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可。
- 切勿一次或短期間服用兩次劑量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、焦慮、失眠及焦躁不安、顫抖、肌張力不全等。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應，如搔癢、蕁麻疹。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.02
- PFS-7200-0246

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮