

藥品使用指導單

必利停®錠 (Labixten®20mg)

■ 藥品成分名

Bilastine

■ 藥品外觀

白色橢圓形錠劑，中央刻痕

■ 作用

緩解12歲以上兒童及成人之過敏性鼻炎及慢性蕁麻疹症狀

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請勿自行停藥或調整用量。

建議空腹服用（進食前一小時或進食後兩小時服用）。

■ 注意事項

- 若您計畫懷孕或已懷孕、正在哺乳，應告知您的醫師及藥師。
- 服藥期間不建議同時服用葡萄柚汁。如果要服用其他藥品（包括處方藥、非處方藥、健康食品、中草藥等），應先諮詢醫師或藥師。
- 避免與食物併服，以免影響藥物吸收。
- 服用此藥物很少發生嗜睡情形，如有發生，請小心駕駛車輛及操作機械。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若忘記服藥應於記起時立即服用。若很接近下一次服藥時間，則跳過忘記的劑量，並待下次正確服藥時間再服藥。
- 勿同時或短時間內服用兩倍劑量。

■ 可能的副作用

- 頭痛、嗜睡、頭暈、疲倦。
- 若症狀持續或加重，請告知醫師。

■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.02
- PFS-7200-0247

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮