

藥品使用指導單

恩美糖®膜衣錠 (Jardiance Duo® 12.5/850mg)

■ 藥品成分名

Empagliflozin/Metformin

■ 藥品外觀

淺粉紅色橢圓形膜衣錠，標記：[S12/850]

■ 作用

做為第二型糖尿病成人病人，在飲食與運動外，改善血糖之輔助治療。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用。根據病人治療現況調整恩美糖®的初始劑量。
建議隨餐服用。

■ 注意事項

- 恩美糖不建議用於第一型糖尿病病人，可能增加其酮酸中毒的風險。
- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對恩美糖®其成分有過敏反應、肝、腎、心臟疾病、計畫懷孕、已懷孕、哺乳。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等），應先諮詢醫師或藥師。
- 配合醫生指示控制飲食和適量運動有助於控制血糖。
- 服藥期間，如有安排需要使用顯影劑之放射檢查、因進行手術或其他程序期間須限制飲食時，應依照醫師指示暫停使用本品。
- 服藥期間，請勿飲酒過量，以免增加乳酸中毒風險。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見：噁心、嘔吐、味覺異常、體重下降等腸胃道副作用，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。
- 若出現下列少見的情形：尿液顏色變深、皮膚或眼睛產生黃疸、呼吸困難、乳酸中毒症狀（異常倦怠、肌肉疼痛、嗜睡、腹痛等）、泌尿道感染症狀（頻尿、排尿疼痛、有灼熱感、尿液呈現混濁狀或背後腰部或腹部疼痛等），請立即停用藥品並就醫。
- 服用可能造成低血糖症狀請小心（詳情請見0159-低血糖處理準則）。

■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.02
- PFS-7200-0249



衛教單意見回饋

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮