

# 藥品使用指導單

## 血得平<sup>®</sup>錠 (Stable<sup>®</sup> 10mg, 25mg )

### ■ 藥品成分名

Hydralazine HCl

### ■ 藥品外觀

Stable 10mg：黃色圓扁形錠劑，標記【232】

Stable 25mg：青綠色圓扁形錠劑，標記【332】

### ■ 作用

高血壓用藥，主要效應是直接擴張微動脈，減少周邊阻力。

### ■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫囑服用，未經醫師同意切勿自行調整或停藥。

### ■ 注意事項

- 服用此藥物可能會影響反應速度或感到暈眩，而影響駕駛、操作機器的安全性，服藥期間應特別注意。
- 服藥後，從躺或坐姿起身時請放慢速度，以避免因姿勢性低血壓而頭暈。
- 本藥品與其他藥品併服可能產生藥物交互作用。服藥期間，如果要服用其他藥品（包括處方藥、非處方藥、健康食品、中草藥等），應先諮詢醫師或藥師。
- 如果您預備懷孕、已經懷孕、須哺乳、或有心血管病史，應先諮詢醫師或藥師，評估是否適合繼續使用此藥品。
- 服藥期間應每天規律性的測量脈搏與血壓。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：腹瀉、頭暈、頭痛、食慾不佳、嘔吐、快速或不規則心跳、便秘、面色潮紅、鼻塞、流淚或眼睛感覺不適。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：手臂或腿部腫脹、胸痛、呼吸短促、肌肉或關節痛、無力、皮膚疹、喉嚨痛和發熱、淋巴腺腫脹。

## ■ 保存方法

- 此藥請於30°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.02
- PFS-7200-0250

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

