

藥品使用指導單

專思達®長效錠(Concerta ER®18mg)

■ 藥品成分名

Methylphenidate HCl

■ 藥品外觀

膠囊狀黃色錠劑；標記：alza 18

■ 作用

中樞神經刺激作用，治療6歲以上及65歲以下患有注意力不足過動症之病人。

■ 用法

- 請遵照醫師處方服用，未經醫師同意切勿自行調整或停藥。
- 建議於白天空腹或飯後服用一次。
- 本品為持續釋放劑型，應整粒吞服，不可咀嚼、撥半或磨碎。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對Concerta ER其成分有過敏反應、計劃懷孕或已懷孕、哺乳婦女、有癲癇、高血壓、心臟疾病、甲狀腺疾病、青光眼、妥瑞氏症、身心科疾病、藥物或酒精成癮、肝腎功能低下等。
- 治療前可測量體重與身高，於治療期間作身高體重成長記錄。
- 服藥後，可能在糞便中觀察到排出的藥物外殼，此為正常現象。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（如抗心律不整藥物、抗癲癇劑、中樞神經抑制劑、抗鬱劑/其他身心科藥物、抗生素等，或非處方用藥、健康食品、中草藥等），應先告知醫師。
- 酒精可能增強藥品的副作用，服藥期間請避免飲酒。
- 服藥後可能有思睡、頭暈、視力模糊副作用，確認身體對藥物反應前，應避免開車、操作機械等需專注活動。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您是規律性的服用此藥，則請於想起時立即服藥。
- 若已接近下次服藥時間，請直接服用下次之劑量即可。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 初期服藥或調整劑量時，可能有口乾、食慾下降、腸胃不適、緊張、失眠、頭痛等現象，若持續嚴重或有其他異常不適請告知醫師。
- 若發生下列情形，應立即就醫：過敏反應(嚴重紅疹、呼吸困難)、心跳不規則、情緒行為改變、視覺模糊、痙攣、嘔吐、激動、流汗、發燒。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.03
- PFS-7200-0252



衛教單意見回饋

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮