

藥品使用指導單

多適達®膠囊(Duodart®0.5/0.4mg)

■ 藥品成分名

Dutasteride/Tamsulosin

■ 藥品外觀

橘色/棕色橢圓形膠囊；標記：【GS 7CZ】

■ 作用

治療攝護腺肥大症，可以改善尿流速率、減小攝護腺體積和緩解相關症狀。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用。

建議劑量為一天口服一顆膠囊，在每日固定同一餐後 30 分鐘服用。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對多適達®膠囊其成分有過敏反應、對磺胺類藥物曾有過敏反應。
- 已懷孕、可能懷孕或哺乳中婦女不可以觸摸此膠囊。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等），應先諮詢醫師或藥師。
- 膠囊須整顆吞服，切勿嚼食或將膠囊打開。直接接觸硬膠囊內的 Dutasteride，可能會對口咽部黏膜造成刺激。
- 服藥期間，可能會發生直立性低血壓（頭暈或眩暈症狀），並可能會導致昏倒。剛開始使用此藥品治療的病人應避免開車、操作機械等可能有危險性的工作，轉換姿勢時放慢動作，且出現症狀時應坐下或躺下休息。
- 考慮進行白內障或青光眼手術前，請主動告知眼科醫師有服用此藥品。
- 使用此藥期間不能捐血，直到使用最後一次藥物經過至少六個月為止。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果您忘記服用，可於原定服藥的 12 小時內服用；但如果已超過 12 小時，就不需要再補服藥品，等到下次服藥時間再服用即可。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 如果下列副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師：便秘、嘔吐、口乾、視力模糊、射精障礙、乳房疼痛、低血壓。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應（癢或起疹、臉或手部紅腫、嘴巴或喉嚨紅腫或刺痛、胸悶、呼吸困難）。

■ 保存方法

- 此藥請於 25°C 以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.05
- PFS-7200-0256



衛教單意見回饋

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮