

藥品使用指導單

Xocova® (COVID-19口服抗病毒藥物)

■ 藥品成分名

Ensitrelvir

■ 藥品外觀

白色至些許淡黃黃色、圓形、錠劑; 標記: (正面) 711, (背面) 125

■ 適應症

Xocova® 為專案核准輸入藥品，適用於具重症風險因子(除懷孕)，未使用氧氣且於發病3天內之≥12歲輕症患者，且無法使用Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) 或 Remdesivir (Veklury®)者。

■ 用法用量

■ 每天一次，連續使用五天，請勿自行停藥。

第一天：一次三顆



第二至五天：每天一次一顆

第二天



第三天



第四天



第五天



00 00

5 days

■ 空腹或是飯後服用均可。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果在十二小時內想起，可盡快補服。
- 如果超過十二小時，請等到下一次服藥時間再使用。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量！

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢醫師或藥師



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

藥品使用指導單

Xocova® (COVID-19口服抗病毒藥物)

■ 藥品交互作用

本藥品之代謝會與多種藥物產生交互作用，進而影響彼此的療效，若目前有服用其他藥品(處方藥、非處方藥、中草藥等)，請主動告知醫師與藥師。如使用下列藥品，**禁止使用Xocova®**：

分類	學名 / 常見商品名	
心律不整藥	Amiodarone / 臧得樂(Cordarone®) Quinidine / 硫酸奎尼丁(Quinidine®)	Dronedarone / 脈泰克(Multaq®) Propafenone / 律諾(Rhynorm®)
身心科藥物	Pimozide / 杜鬱(Topimo®)	
抗癲癇藥物	Carbamazepine / 癲通(Tegretol®) Phenobarbital / 苯巴比妥(Phenobarbital®)	Phenytoin / 癲能停(Dilantin®) Primidone / 邁蘇靈(Mysoline®)
抗感染藥物	抗結核菌藥物： Rifampicin / 立泛黴素(Rifampicin®)	Rifampicin複方藥物 / 衛肺特(Rifater®)、樂肺寧(Rifinah®)
麥角衍伸物	偏頭痛藥物： Dihydroergotamine / 樂息痛(Lesiton®) Ergotamine / 痛安(Ergocafe®)	
	婦科用藥： Ergometrine / 麥角新鹼(Ergonovine®) Methylergonovine / 美脫琴(Methergin®)	
癌症用藥	Apalutamide / 安列康(Erleada®) Avapritinib / 泰時維(Ayvakit®) Dabrafenib / 泰伏樂(Tafinlar®)	Enzalutamide / 安可坦(Xtandi®) Midostaurin / 療德妥(Rydapt®) Lorlatinib / 瘤利剋(Lorviqua®) Mitotane / 萊舒淨(Lysodren®)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢醫師或藥師



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

藥品使用指導單

Xocova® (COVID-19口服抗病毒藥物)

■ 藥品交互作用

- 若您有在使用以下藥物，**醫生會視情況調整藥物或決定您是否適合使用Xocova®**：

須停藥、更換藥品 或調整劑量



血壓藥	抗血栓藥	抗感染藥
血糖藥	肺高壓用藥	癌症用藥
血脂藥	心血管用藥	免疫抑制/ 調節劑
利尿劑	鎮靜安眠用藥	秋水仙素
止痛藥	身心科用藥	泌尿科用藥 (含威而鋼)

- 所有的用藥調整(劑量調整、更換替代用藥、停藥等)及臨床監測皆從第一劑Xocova®開始後持續至停藥後10天(共15天)。

■ 副作用

- 紅疹、瘙癢等、噁心、嘔吐、腹瀉、腹部不適、頭痛、血脂異常症、HDL 膽固醇下降、三酸甘油酯上升、膽紅素上升、血中膽固醇下降、血清鐵上升等。
- 如果出現過敏反或任何不適狀況，請儘快就醫。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處，避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Xocova中文說明書、公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 114.05
- PFS-7200-0257



衛教單滿意度調查

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢醫師或藥師



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮