

藥品使用指導單

吉多利®錠 (Ketosteril® 630mg)

■ 藥品成分名

Nitrogen 36mg / Calcium 0.05g

■ 藥品外觀

鮮黃色，長圓柱形，錠劑；大小：1.70公分。

■ 作用

慢性腎不全時胺基酸之補給。能夠有效降低體內尿素的形成，減少尿毒素的累積，減輕尿毒症狀。

■ 用法

請遵從醫師的指示服藥。建議隨餐服用以增加吸收效果。

每日用量估算為每5公斤體重，一顆吉多利®錠。

■ 注意事項

- 禁止使用於高血鈣症、胺基酸代謝紊亂病人。
- 到目前為止尚無應用於孕婦及幼兒的報告。若您計畫懷孕或已懷孕，就診時請務必告知醫師。
- 請同時配合醫師指示，限制每日蛋白質攝取量，以達到效果。同時應確定飲食中有攝取足夠的卡路里。
- 本藥含鈣鹽，與含鈣藥品併用可能造成血中鈣濃度過高，請注意是否產生高血鈣症狀（如：倦怠、肌肉無力、厭食、多尿等）。應定期檢查血清鈣含量。
- 為了避免干擾藥物吸收，服藥期間不建議併用容易與鈣結合的藥物（例如：四環黴素Tetracycline）。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果您於主餐中忘記服用，可於餐後一小時內服用；但如果已超過一小時，就不需要再補服藥品，等到下一餐時再服用即可。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 過敏、脹氣、偶有高血鈣症。
- 如果用藥後出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.05
- PFS-7200-0258



衛教單意見回饋

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮