

藥品使用指導單

賜安特®膜衣錠 (Setron®2mg)

■ 藥品成分名

Granisetron

■ 藥品外觀

白色三角型膜衣錠，標記：[NK/608]

■ 作用

預防及治療化學療法與放射線療法引起的噁心、嘔吐。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請依照醫囑服藥，不可自行調整用量。

第一次給藥劑量應於治療前一小時內給予，一天一次，最多持續至一週。

■ 注意事項

- 用藥前，若有以下情形，請先告知醫師：曾對 Setron 其成分有過敏反應、有計畫懷孕、已懷孕、哺乳、心臟疾病、電解質異常（如低血鉀、低血鎂症）。
- 患有罕見遺傳疾病，如半乳糖不耐症，乳糖酶缺乏症及葡萄糖-半乳糖吸收不良之患者，建議不要使用此藥。
- 可能會降低腸的蠕動性，故有亞急性腸阻塞症狀者，使用後需嚴密監測。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗等），應先諮詢醫（藥）師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見的副作用為暫時性之頭痛、便秘。
- 其他不常見副作用為過敏反應、蕁麻疹。
- 若疑似發生血清素症候群之症狀，應停藥並立即告知醫師。如：精神狀態改變（情激激動、幻覺、譫妄及昏迷）、自律神經失調（心搏過速、血壓不穩、頭暈、發汗、潮紅、體溫過高）、神經肌肉症狀（顫抖、僵直、肌陣攣、反射亢進、不協調）、癲癇發作，可能伴隨胃腸道症狀（噁心、嘔吐、腹瀉）。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C 以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/114.06
- PFS-7200-0260



衛教單意見回饋

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮