

藥品使用指導單

康必舒[®]錠(Candis[®] 8mg)

■ 藥品成分名

Candesartan

■ 藥品外觀

淡粉色，圓扁形，錠劑；大小：0.7公分

■ 作用

治療本態性高血壓。

治療左心室射出分率 40% 以下之心臟衰竭病患，以減少心臟血管死亡率或心衰竭導致之住院。

■ 用法

本藥須由醫師處方使用，請於固定時間服用，可空腹服用或與食物併服，未經醫師許可請勿擅自調整用藥。

■ 注意事項

- 對Candesartan或任何賦形劑成分過敏者，以及計畫懷孕、已懷孕或哺乳婦女，禁止使用。治療期間應避孕。
- 在服用本藥前，如有以下情形，請先告知醫師。
 - 使用其他藥品，如利尿劑、降血壓藥、非類固醇抗發炎藥物 (NSAIDs) 等。
 - 肝腎功能不全、膽汁鬱滯、腎動脈狹窄、原發性皮質醛酮分泌過多症。
- 服藥期間，如果要服用其他藥品（包括非處方用藥、維他命、健康食品、中草藥、疫苗、預防針等），應先諮詢醫師或藥師。
- 腎功能不全的高血壓病人，使用時應定期監測腎功能和血鉀值。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 最常見的副作用為頭暈、頭痛及呼吸道感染。如果副作用發生一段時間後，症狀持續惡化，請盡快通知醫師。
- 若發生下列情形，請立即告知醫師：過敏反應（癢或起疹、臉或手部紅腫、嘴巴或喉嚨紅腫或刺痛、胸悶、呼吸困難）。

■ 保存方法

- 此藥請於25°C以下室溫、避免陽光直射的陰涼處儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 114.07
- PFS-7200-0261



衛教單意見回饋

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮